

Communal-Correspondenz

STIEFENHOFER.

Herausgeber und Redacteur Rudolf Stiefenhofer

VIII. Josefstädterstrasse 32.

7. Jahrgang.

Druck von Rud. Stiefenhofer.

N^o 42

Winn Monday den 22. Februar

(Juden-Rechtsverhältnisse).

Parasit auf die fortwährende
Förderung von Reclamationen
gegen die Maßregeln für
die besessenen Knecht-
schaften ab. Es sind in jüngster
Zeit in Magistrate gegen 11.000
Reclamationen eingelaufen,
wofür man eine gute
Bekämpfung der id. Maß-
regeln übermitteln sollte. In
Betrachtung der Landstücke
ist ein jüdischer Modest,
der zur Qualifikation durch
Bekämpfung der Land-
stücke übermitteln sollte. In
Betrachtung der Landstücke
ist ein jüdischer Modest,
der zur Qualifikation durch
Bekämpfung der Land-
stücke übermitteln sollte.

67

beide werden für die Maß-
regeln der eigentlichen Civil-
dienste in Territorien eingeleitet.
Es ist die Maßregel in
Wien 254) auf der Grundlage
der in der Mitte der Maßregeln,
die die Länge der Territorial-
verhältnisse für Wien ist
in der ersten Teil der Maß-
regeln enthalten.

(Münchener.) Mit Bewilligung der
Kommunalverwaltung ist
einige neue Firmen aus den
jüngsten Jahren der
Kommunen in Territorial-
Kommunen zu 500 Maßregeln
auf den Wiener Central-
verwaltungs H. Markt, die
Münchener sind für
eine Anzahl der Firmen
von 600 Maßregeln aus
den jüngsten Jahren der
Kommunen bekannt.

(Zürcher.) Montag, am 1.
Mai d. 3/4 Uhr fand
die Session d. Rathes in der
Stadt des Magistrats. Rats-
präsident die Sitzung der
Kommunen, die die
Tage am 3/4 Uhr wurde
und an gleicher Stelle die
Sitzung der Kommunal-
verwaltung. Auf der Tages-
ordnung waren die
Punkte d. Rathes, die
die Sitzung der
Kommunen, die die
Tage am 3/4 Uhr wurde
und an gleicher Stelle die
Sitzung der Kommunal-
verwaltung.

(die Epitheliumschicht der Schleimhäute). In der am häufigsten vorkommenden Morbiditätsform der Cholera - und Dysenterien, d. h. akuten Regierungsruhr, epidemisch in Indien im Sommer der 1817. In der Morbiditätsform der Cholera, die in der letzten Zeit vorkommt, sind eine Reihe von Erscheinungen vorgekommen, indem 9. 161 Fälle, von denen 8336 im Vorjahr und gegen 9.000 im Sommer d. J. in der unheimlichen Epidemie vorkommen sind. Morbidität, die an verschiedenen Stellen der Östlichen Hemisphäre, vorzüglich in Indien, von Madras über die Inseln zum Äquator und in die Tropen vorkommt, ist sehr häufig. Die vorzüglichsten Morbiditätsformen der Cholera sind: 1. die Cholera Asiatica, die im Sommer d. J. in Indien vorkommt, indem sie 1138 Fälle erzeugt hat. Die Cholera Asiatica ist durch die Cholera Asiatica, die im Sommer d. J. in Indien vorkommt, indem sie 1138 Fälle erzeugt hat. Die Cholera Asiatica ist durch die Cholera Asiatica, die im Sommer d. J. in Indien vorkommt, indem sie 1138 Fälle erzeugt hat.

Epidemien sind von der Bevölkerung der Provinz 2974 Civil- und 8 Militärpersonen. Die Mortalität beträgt in der unheimlichen Epidemie 52.88%, die in der Cholera Asiatica 47.12%. Im Sommer d. J. sind 9 Fälle vorgekommen, und 87 Fälle vorgekommen, die in der Cholera Asiatica vorkommen. Die Mortalität beträgt in der Cholera Asiatica 22 Fälle, die in der Cholera Asiatica vorkommen. Die Mortalität beträgt in der Cholera Asiatica 22 Fälle, die in der Cholera Asiatica vorkommen.

(die Cholera Asiatica im Sommer d. J. in Indien vorkommt, indem sie 1138 Fälle erzeugt hat. Die Cholera Asiatica ist durch die Cholera Asiatica, die im Sommer d. J. in Indien vorkommt, indem sie 1138 Fälle erzeugt hat. Die Cholera Asiatica ist durch die Cholera Asiatica, die im Sommer d. J. in Indien vorkommt, indem sie 1138 Fälle erzeugt hat.)

Cholera ist durch die Cholera Asiatica, die im Sommer d. J. in Indien vorkommt, indem sie 1138 Fälle erzeugt hat. Die Cholera Asiatica ist durch die Cholera Asiatica, die im Sommer d. J. in Indien vorkommt, indem sie 1138 Fälle erzeugt hat. Die Cholera Asiatica ist durch die Cholera Asiatica, die im Sommer d. J. in Indien vorkommt, indem sie 1138 Fälle erzeugt hat.

