Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5



Fig. 6.



Jacob Xaver Schmutzer.

REPPHÜHNER VERSCHIEDENER ART.

Die *Repphühner*, von denen wir hier fünf Arten aufgestellt sehen, gehören auch zu dem weitläufigen Geschlechte der *Waldhühner*, die 67 Arten zählen, und wovon wir schon im zweyten Theile mehrere Arten haben kennen lernen.

Das gemeine Repphuhn.

(*Tetrao perdix.*)

Fig. 1. Das Männchen.

Fig. 2. Das Weibchen.

Das *gemeine Repphuhn*, welches seines schmackhaften Fleisches wegen überall beliebt ist, lebt in den gemäfsigten Himmelsstrichen fast von ganz Europa, nährt sich von grüner Saat, Körnern, mehrern Pflanzen und verschiedenen Insecten, worunter es die Eyer der Ameisen vorzüglich liebt. Seine Länge beträgt 12 Zoll. Die Farbe des Männchens ist eine schöne Mischung von Aschgrau und Schwarz, welches am Kopfe, Rücken, auf den Flügeln und am Schwanze mit Rothbraun wechselt; auf der Brust hat es einen grofsen kastanienbraunen Fleck in Form eines Hufeisens. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch ein dunkleres, weniger ausgezeichnetes Gefieder, auch fehlt ihm der hufeisenförmige Fleck auf der Brust.

Fig. 3. Das Europäische Rothhuhn.

(*Tetrao rufus.*)

Das *rothe Repphuhn* oder *Rothhuhn* findet sich nur hier und da in Deutschland, desto häufiger ist es aber in Frankreich, Italien und mehrern Ländern von Asien und Afrika, wo man es herdenweise antrifft. Es ist gröfser als das gemeine Repphuhn, hat ein noch viel schmackhafteres Fleisch, nährt sich übrigens aber mit ihm auf einerley Art. Seines Gefieders wegen rechnet man das Rothhuhn unter die schönen Vögel. Schnabel und Füfse sind roth, Rücken, Flügel und Schwanz aschgraubraun, Kehle weifs, mit einer schwarzen Binde umgeben; auf den Seiten zieren es weifsschwarze, orangefarbige, halbmondförmige Flecken.

Fig. 4. Das Griechische Repphuhn.

(*Tetrao rufus graeca.*)

Das *Griechische Repphuhn*, welches in Menge in Griechenland, vorzüglich aber auf der Insel Candia lebt, ist eine Spielart des vorigen, unterscheidet sich aber von ihm durch die Farbe seines Kopfes, Rückens, der Flügel und des Schwanzes, die ein bläuliches Aschgrau ist.

Fig. 5. Das geperlte Repphuhn.

(*Tetrao perlatus.*)

Das Vaterland dieses schönen Repphuhnes, welches gröfser als das gemeine Repphuhn ist, ist China, wo man es *Tsche-ku* nennt. Scheitel, Flügel und Schwanz sind rothbraun, Hals, Brust und Bauch schwärzlichbraun mit runden weifsen Flecken. Die Füfse des Männchens sind mit einem Sporne versehen.

Fig. 6. Das rothhalsige Repphuhn.

(*Tetrao rubricollis.*)

Diese Gattung lebt in Afrika, ist so grofs als ein kleines gemeines Repphuhn, hat ein braunes, am Bauche und an den Seiten mit Weifs untermischtes Gefieder, und zeichnet sich durch die rothe Farbe seines Halses aus, wovon es auch den Nahmen trägt.

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE PERDRIX.

On trouve cinq espèces différentes de *perdrix* représentées sur la table ci-jointe. Ces oiseaux appartiennent dans la famille des *gélinotes*, qui est tellement nombreuse qu'on en compte 67 espèces; nous en avons fait connaître plusieurs dans le second Volume de ce Porte-feuille.

Fig. 1. La Perdrix commune.

(*Tetrao perdix.*)

Fig. 1. Le mâle.

Fig. 2. La femelle.

La *Perdrix commune* est généralement récherchée à cause du bon goût de sa chair, et elle se trouve dans les régions tempérées de presque toute l'Europe. Elle se nourrit de la pointe verte du blé, de graines, de plusieurs plantes et de différentes insectes; la nourriture cependant qu'elle parait aimer de préférence sont les chrysalides de fourmis, appellées improprement oeufs. Elle à 12 pouces de longueur; la couleur du mâle est un beau mélange de gris cendré et de noir, qui est varié de roux à la tête, au dos, aux ailes et à la queue; la poitrine est marquée d'une grande tache brunâtre en forme de fer à cheval. La femelle diffère du mâle en se qu'elle n'a pas à la poitrine cette tache en forme de fer à cheval, et que son plumage est plus foncé et moins coloré.

Fig. 3. La Perdrix rouge d'Europe.

(*Tetrao rufus.*)

Cette espèce de *perdrix* ne se trouve que dans quelques parties de l'Allemagne, mais d'autant plus fréquemment en France, en Italie et dans plusieurs contrées de l'Asie et de l'Afrique, où elle vit réunie en bandes ou volées. Elle est plus grande que la perdrix commune et sa chair est encore plus délicate; sa nourriture est la même. A cause de son plumage elle est comptée parmi les beaux oiseaux. Son bec et ses pieds sont rouges; le dos, les ailes et la queue sont d'un gris-cendré tirant sur le brun; sa gorge est blanche et entourée d'un bord noir; les plumes des côtes sont joliment colorées de taches blanches, noires et de jaune d'orange en forme de croissant.

Fig. 4. La Perdrix de Grèce, ou la Bartavelle.

(*Tetrao rufus graeca.*)

La *bartavelle* qu'on trouve en grande quantité dans la Grèce et surtout dans l'isle de Candie, n'est qu'une variété de l'espèce précédente, elle n'en diffère que par la couleur de la tête, du dos, des ailes et de la queue, dont les plumes sont d'un gris-cendré tirant sur le bleu.

Fig. 5. La Perdrix perlée.

(*Tetrao perlatus.*)

La Chine est la véritable patrie de la *perdrix perlée* et les habitans l'appellent *Tche-cou*. Elle est un peu plus grosse que la perdrix commune; le plumage du sommet de la tête, des ailes et de la queue est d'un rouxbrun, celui du col, de la poitrine et du ventre d'un brun noirâtre, mais varié de taches ou raies blanchâtres de différentes figures. Les pieds des mâles sont garnis d'ergots.

Fig. 6. La Perdrix rouge d'Afrique.

(*Tetrao rubricollis.*)

Cette espèce, qui se trouve surtout dans l'Afrique, est de la grosseur d'une petite perdrix commune. Son plumage est d'un brun foncé, mais éclairci sur le bord de chaque plume au ventre et aux côtés; elle se distingue principalement par la couleur rouge de sa gorge, qui lui a donné aussi son nom.

WIENER-STADTBIBLIOTHEK