Vögel. XLIV. Aves. XLIV. Oiseaux. XLIV.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Jacob Bauer Schmuzer.

VI. B. 56.

FINKEN

VERSCHIEDENER ART.

Wir sehen hier aus dem weitläufigen Finkengeschlechte gleichfalls wieder 6 Arten, die ebenfalls durch ihr schönes Gefieder, durch ihren angenehmen Gesang oder ihre Gelehrigkeit allgemein beliebt sind, und deßwegen auch insgesammt als Stubenvögel gehalten werden.

Fig. 1. Der Stieglitz.

(*Fringilla carduelis.*)

Der *Stieglitz* bewohnt ganz Europa, einige Striche von Asien und Afrika. Sein sanft gemischtes Gefieder ist auf dem Rücken olivenbraun, am Bauche röthlichweiss. Die sammtschwarzen Flügel- und Schwanzfedern sind blau gesäumt, und um die Augen und um den Schnabel herum läuft eine schöne scharlachrothe Binde. Seine Nahrung besteht bloss aus mehreren Sämereyen; Insecten frisst er nie. Vorzüglich liebt er den Distelsamen, daher er auch in manchen Provinzen der Distelfink heißt.

Fig. 2. Der Canarien-Vogel.

(*Fringilla canaria.*)

Dieser so allgemein beliebte Vogel wurde zu Anfange des sechzehnten Jahrhunderts durch Schiffe aus seinem eigentlichen Vaterlande, den *Canarischen Inseln*, mit nach Europa gebracht. Da man ihn hier bald seines lieblichen Gesanges wegen schätzen lernte, so bemühte man sich um seine Fortpflanzung, die auch so gut gelang, dass man jetzt allenthalben Canarien-Vögel in Zimmern findet. Ihre ursprüngliche Farbe, die graugrünlich ist, hat man durch Cultur sehr vermannigfaltiget, so dass man jetzt auch gelbe, weisse und gefleckte Canarien-Vögel findet. Ihre Nahrung besteht aus Sämereyen, worunter sie vorzüglich den Mohn, Canarien- und Hanfsamen lieben. Die Canarien-Vögel lernen auch mit grosser Geschicklichkeit fremde Melodien nachpfeifen.

Fig. 3. Der Zeisig.

(*Fringilla spinus.*)

Der niedliche gelehrige *Zeisig* ist der kleinste unter den Finkengattungen, und nur 5 Zoll lang. Er bewohnt fast ganz Europa, und nährt sich von mehreren Sämereyen, unter denen er vorzüglich den Erlensamen liebt. Sein Nest bauet er in Schwarzwäldern auf die äußersten Spitzen hoher Zweige, woraus die Fabel entstand, dass die Zeisignester unsichtbar wären.

Fig. 4. u. 5. Der gemeine und Bluthänfling.

(*Fringilla cannabina et linota.*)

Der *gemeine Hänfling* ist etwas kleiner als der Stieglitz, bewohnt ganz Europa, das südliche Russland und Nord-Amerika. Er hat einen äußerst angenehmen Gesang, und nährt sich von Sämereyen. In den ersten Jahren sieht er rothbraun und schmutzigweiss aus. Im dritten Jahre ändert aber das Männchen seine Zeichnung, bekommt einen blutrothen Scheitel und Brust, und ist dann unter dem Nahmen *Bluthänfling* (*Fig.* 5.) bekannt.

Fig. 6. Der Flachsfink.

(*Fringilla linaria.*)

Er ist etwas kleiner als der gemeine Hänfling. Das Vaterland des Flachsfinken sind eigentlich die Nordländer, doch kommt er im October in grosen Zügen auch zu uns nach Deutschland. In der Farbe gleicht er ziemlich dem Bluthänflinge, und nährt sich wie der gemeine Hänfling von mehreren Sämereyen. Sein Gesang ist nicht angenehm.

PINÇONS
DE DIFFÉRENTES ESPÈCES.

Nous voyons encore ici six autres espèces d'oiseaux, du genre nombreux de pinçons, qui sont généralement estimés par la beauté de leur plumage, leur chant agréable, ou par leur docilité, et qui par ces raisons sont tous regardés comme oiseaux de volière.

Fig. 1. Le Chardonneret.
(*Fringilla carduelis.*)

Il habite toute l'Europe, quelques parties de l'Asie et de l'Afrique. Son plumage doucement mélangé, est d'un brun olive sur le dos, et d'un blanc rougeâtre sous le ventre. Les pennes des ailes et de la queue d'un noir velouté, sont bordées de bleu, et autour des yeux et du bec il regne une bande d'un beau rouge écarlate. Sa nourriture consiste en plusieurs espèces de semences; il ne mange jamais d'insectes. Il aime pardessus tout la semence de chardon; d'ou lui est venu le nom de *Chardonneret.*

Fig. 2. Le Serin des Canaries.
(*Fringilla canaria.*)

Cet oiseau si généralement aimé fut apporté en Europe par des vaisseaux au commencement du seizième siècle des îles Canaries, d'où il est originaire. Comme il fut bientôt recherché à cause de son charmant gosier, on se donna toutes les peines possibles pour le multiplier, ce qui réussit au point, qu'on trouve actuellement partout en cage des serins des Canaries. Sa couleur primitive qui était d'un gris verdâtre, a été tellement variée qu'on en voit à présent des jaunes, des blancs et des tachetés. Il se nourrit de différentes espèces de graines, entre lesquelles il préfère celle de pavot, le bled de canarie et le chenevis. Les serins des canaries saisissent aussi avec beaucoup de facilité les aires qu'on veut leurs apprendre.

Fig. 3. Le Tarin.
(*Fringilla spinus.*)

Le joli et docile *tarin* est le plus petit du genre des pinçons: il n'a que cinq pouces de long. Il habite presque toutes les parties de l'Europe, et se nourrit de plusieurs sortes de graines, entre lesquelles il aime particulièrement la semence d'aune. Il construit son nid dans les forêts vertes à l'extrêmité des plus hautes branches; d'ou vient la fable que les nids de tarins sont invisibles.

Fig. 4. et 5. La Linotte et le grand Linot des vignes.
(*Fringilla cannabina et linota.*)

La *Linotte* est un peu plus petite que le chardonneret, et se trouve dans toutes les parties de l'Europe, dans la Russie méridionale, et l'Amérique septentrionale. Elle a un chant très-agréable, et se nourrit de graines. Les premières années son plumage est d'un brun rouillé, et d'un blanc sale; mais dans la troisième année, le sommet de la tête et la poitrine du mâle se changent en un rouge de sang, et alors il est connu sous le nom de *grand linot* de vignes (*Fig. 5.*)

Fig. 6. Le Sizerin.
(*Fringilla linaria.*)

Il est un peu plus petit que la linote. La patrie du sizerin sont proprement les régions du nord, cependant dans le mois d'Octobre il passe en grandes volées en Allemagne. Il ressemble assez, par la couleur, au linot de vigne, et se nourrit comme la linotte de différentes sortes de graines. Son chant n'est pas agréable.

WIENER STADTBIBLIOTHEK