Vögel. XLV. Aves. XLV. Oiseaux XLV.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Jacob Bauer Schmuzer.

VI. B. 41.

RAUBVÖGEL

VERSCHIEDENER ART.

Fig. 1. Der gemeine Geyer.

(*Vultur cinereus.*)

Der *gemeine Geyer* bewohnt eigentlich nur die höhern waldigen Gebirge von Europa, doch trifft man ihn bisweilen auch in den flachen Gegenden Deutschlands an. Seine Länge beträgt 4 Fuſs, seine Breite mit ausgespannten Flügeln 9 Fuſs. Die Hauptfarbe seines Gefieders ist dunkelbraun, mit hellbraunen Spitzen. Der schwarze Schnabel ist mit einer blauen Wachshaut versehen. Wenn er ruhig sitzt, so bilden die Halswolle und die darunter stehenden Federn eine förmliche Halskrause, was ihm ein sonderbares Ansehen gibt.

Fig. 2. Der Aasgeyer.

(*Vultur percnopterus.*)

Der *Aasgeyer* hat die Gröſse des vorigen, bewohnt Syrien und Arabien, vorzüglich aber Aegypten, wo er sich in und um Cairo in grosser Menge aufhält. Da er sich vorzüglich vom Aase nährt, so ist er für Aegypten äuſserst nothwendig, weil er die von den jährlichen Nil-Ueberschwemmungen zurück gebliebenen todten Thiere und Ungeziefer auffrisst, die auſser dem bey der Sorglosigkeit der Aegypter die ansteckendsten Krankheiten hervor bringen würden. Deſswegen hält man dort auch den Aasgeyer für einen geweihten Vogel, den niemand tödten darf.

Fig. 3. Der Norwegische Geyer.

(*Vultur leucocephalus.*)

Diese Geyerart bewohnt auſser mehreren Europäischen Gegenden vorzüglich das kalte Norwegen, und sein weiſses Gefieder macht ihn zu einem schönen Vogel.

Fig. 4. Der Brasilianische Geyer.

(*Vultur aura.*)

Der *Brasilianische Geyer* oder *Urubu* lebt in Nord- und Süd-Amerika und in West-Indien, erreicht die Gröſse eines Truthahnes, und lebt vorzüglich vom Aase, das er bey seinem scharfen Geruche in groſser Entfernung auswittert. Die nackten warzigen Seiten des Kopfes sind blau und gelblich, das übrige Gefieder schwarzbraun, mit grünlichem Schiller.

Fig. 5. Der Secretär.

(*Falco serpentarius.*)

Den *Secretär*, der zur Falkengattung gehört, sollte man auf den ersten Blick wegen seiner langen Füſse für einen Sumpfvogel halten, doch sein gekrümmter Schnabel und die Krallen verrathen hinlänglich den Raubvogel. Er hält sich vorzüglich am Vorgebirge der guten Hoffnung und auf den Philippinischen Inseln auf, wird 3 Fuſs hoch, und lebt hauptsächlich von Ratten, Mäusen, Eidechsen und Schlangen. Letztere faſst er behende mit den Krallen, und wirft sie mit Heftigkeit gegen die Erde, um sie zu tödten. Sein Gefieder am Halse, Bauche und am Rücken ist bläulichgrau, der Schwanz schwarz, mit weiſsem Saume, und die zwey mittlern Federn haben doppelte Länge. Am Hinterkopfe hängt ein lockerer Busch schwarzer Federn, welche man mit Schreibfedern verglich, die hinter dem Ohre steckten, und ihm deſswegen den Nahmen des *Secretärs* gab.

Fig. 6. Der Malteser-Geyer.

(*Vultur fuscus.*)

Der *Malteser-Geyer* wird etwas gröſser als ein Haushahn, lebt auf der Insel Malta und an den Afrikanischen Küsten des mittelländischen Meeres. Sein ganzer Körper ist mit braunen Federn bedeckt, die bald heller, bald dunkler sind.

DIFFÉRENTES ESPÈCES D'OISEAUX DE PROIE.

Fig. 1. Le grand Vautour.

(*Vultur cinereus.*)

Le *grand Vautour* habite les plus hautes montagnes de l'Europe qui sont couvertes de forêts; mais quelquefois on le trouve aussi dans les plaines de l'Allemagne. Il a quatre pieds de longueur et son envergure est de 9 pieds. Tout le plumage est d'un brun sombre et le bout de chaque plume est d'un brun-clair. Le bec noir est entouré d'une peau calleuse de couleur bleue. Quand l'oiseau est assis, le long duvet qui couvre son cou et les plumes longues qui bordent de chaque côté ce duvet, forment une espèce de cravate et donnent à l'oiseau un air tout à fait singulier.

Fig. 2. Le Vautour d'Égypte.

(*Vultur percnopterus.*)

Le *Vautour d'Egypte* a la même grandeur que le précédent; il habite la Syrie, l'Arabie et surtout l'Égypte, où il vit en grand nombre dans la ville de Caire et aux environs. Comme il se nourrit de charognes il rend à l'Égypte le plus grand service en consommant les animaux morts, qui restent annuellement sur la terre après les inondations du Nil, et qui avec l'insouciance des Égyptiens à cet égard infecteraient l'air et produiraient les maladies les plus contagieuses. C'est par cette raison que ce Vautour y est un oiseau sacré, que personne n'ose tuer.

Fig. 3. Le Vautour de Norvège.

(*Vultur leucocephalus.*)

Cette espèce de Vautours se trouve dans plusieurs pays de l'Europe, mais surtout dans les régions septentrionales de la Norvège. La couleur de son plumage, qui est d'un blanc de neige, lui donne une grande beauté.

Fig. 4. Le Vautour du Brésil, ou l'Orubu.

(*Vultur aura.*)

On trouve le *Vautour de Brésil* dans l'Amérique septentrionale et méridionale, ainsi que dans les Indes occidentales. Sa grandeur est celle d'un coq d'Inde; il se nourrit principalement de charogne, dont il a le vent de très-loin, tant son odorat est fin. Les côtés de sa tête sont dégarnis de plumes, couverts de verrues et d'une couleur bleue et jaunâtre; tout le reste de son plumage est d'un brun-noir changeant de vert.

Fig. 5. Le Messager du Cap de Bonne-Espérance.

(*Falco serpentarius.*)

Le *Messager* a du rapport avec les faucons; à cause de ses longs pieds on le prendrait au premier coup d'oeil pour un oiseau aquatique, mais à son bec arqué et à ses griffes on reconnait bientôt l'oiseau de proie. On le trouve principalement au Cap de bonne-espérance et dans les Isles Philippines; sa hauteur est de 3 pieds et sa nourriture consiste en rats, souris, lézards, crapauds et serpens; il saisit les derniers avec ses griffes, les enlève à une grande hauteur et les jette ensuite avec violence contre la terre pour les tuer. Le plumage de son cou, du ventre et du dos est d'un gris-bleuâtre, celui de la queue et noir à bords blancs est les deux plumes de son milieu ont le double des autres en longueur. Sur le derrière de la tête il porte une touffe légère de plumes noires.

Fig. 6. Le Vautour de Malte.

(*Vultur fuscus.*)

La longueur de cette espèce de Vautours est celle d'un coq domestique; elle se trouve à Malte de dans les parties de l'Afrique voisines et la méditerranée. Tout son corps est couvert de plumes brunes, qui sont plus claires dans un endroit et dans l'autre plus foncées.

WIENER STADTBIBLIOTHEK