Vögel XLVI. Aves. XLVI. Oiseaux XLVI.

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.



Jacob Bauer Schmitzer.

M.B. 46.

RAUBVÖGEL

VERSCHIEDENER ART.

Der Seeadler.

(*Falco ossifragus.*)

Fig. 1. Das Männchen.

Fig. 2. Das Weibchen.

Der *Seeadler* gehört mit zu den gröfsten Raubvögeln; denn er erreicht eine Länge von 3 Fufs 10 Zoll, und mifst mit ausgespannten Flügeln 8 Fufs. Man findet ihn aufser einigen Gegenden Deutschlands, fast in ganz Europa, in Asien und Nord-Amerika. Er hält sich gewöhnlich am Meeresufer, an fischreichen Landseen und Flüssen auf, wo er seiner Lieblingsnahrung, den Fischen, nachstellt. Da er weniger scharf als die übrigen Raubvögel sieht, und seine Schwingen auch kürzer sind, so fliegt er nicht hoch, und streicht nur über die Erde und Wasserflächen hin. Sein Nest bauet er in entlegenen Waldungen auf die höchsten Bäume aus Reisig. Das Gefieder des Seeadlers besteht aus einer Mischung von Roth-, Schwarz- und Graubraun. Die Beine oder Fänge sind gelb und geschuppt. Das Männchen ist etwas kleiner als das Weibchen, und sein Gefieder ist viel heller, und hier und da mit weifsen Stellen untermischt.

Fig. 3. Der Französische Adler.

(*Falco gallicus.*)

Dieser Adler wird 2 Fufs lang, 5 Fufs breit, und lebt vorzüglich in Frankreich. Der Hinterkopf, Nacken, Rücken und die Flügel sind graulichbraun, der Hals, die Brust und der Bauch weifs mit rothbraunen Flecken. Er lebt von mehreren kleinen Thieren, als Ratten, Mäusen, Hamstern u. s. w. Doch verachtet er auch Frösche nicht.

Fig. 4. Der Fischaar.

(*Falco haliaetos.*)

Der *Fischaar* oder die *Moosweihe* ist den Fischereyen sehr nachtheilig, da Fische seine hauptsächlichste Nahrung sind. Er erblickt sie wegen seines scharfen Gesichtes in der gröfsten Höhe, und schiefst dann schnell auf sie herab. Seine Länge beträgt 2 Fufs 5 Zoll, seine Flügelbreite 6 Fufs 6 Zoll. Das Gefieder ist am Halse und Bauche weifs, mit rothen und braunen Flecken. Die Flügel sind schwarzbraun, weifs gesäumt, die Füfse gelb, der Obertheil des Kopfes gelblich und weifs. Man trifft den Fischaar aufser Europa, auch in mehrern Theilen von Asien, Afrika und Amerika an. In Deutschland ist er nicht selten.

Fig. 5. Der Falke mit rother Kehle.

(*Falco aquilinus.*)

Dieser schöne Falke wird 1 Fufs 11 Zoll lang, und findet sich vorzüglich in Cayenne in Amerika. Sein Gefieder ist glänzend indigblau, die Füfse sind gelb, der Schnabel bläulich mit einer dunkelgelben Wachshaut. Die Kehle und Seiten des Kopfes sind mit kleinen purpurrothen Federchen besetzt.

Fig. 6. Der Bussard.

(*Falco buteo.*)

Der *Bussard* oder *Mäusefalk* ist ein in ganz Deutschland bekannter Raubvogel; lebt aber aufser dem auch noch in den übrigen Ländern von Europa und in Nord-Amerika. Er ist 2 Fufs 3 Zoll lang und 5 Fufs breit. Sein Gefieder ist ein abwechselndes Rostbraun und Graubraun, die Schwungfedern sind schwarzbraun; doch ist das Farbenspiel beym Bussard oft sehr verschieden. Er nistet in Wäldern auf den höchsten Fichten, und legt in ein aus Reisig unordentlich zusammen gebautes Nest 3 bis 4 weifsliche Eyer. Seine Nahrung besteht ausser mehreren kleinen Säugethieren hauptsächlich aus Eidechsen, Fröschen, Kröten, Ringelnattern und andern Amphibien.

D'OISEAUX DE PROIE

DE DIFFÉRENTES ESPÈCES.

L'Orfraie ou l'Ossifrage.

(*Falco ossifragus.*)

Fig. 1. Le Mâle.

Fig. 2. La Femelle.

L'*Orfraie* est une des espèces des plus grands oiseaux de proie; il a 3 pieds et 10 pouces de longueur et 8 pieds d'envergure. Il se trouve dans presque toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique septentrionale et même dans quelques contrées de l'Allemagne, il se tient volontiers près des bords de la mer et assés souvent dans le milieu des terres à portée des étangs et des rivières poissonneuses, où il peut trouver facilement des poissons, qui sont sa nourriture ordinaire. Comme il a la vue moins perçante que les autres oiseaux de proie, et que ses ailes sont aussi plus courtes, il ne s'élève pas à une grande hauteur et plane toujours à une petite distance au dessus de la terre ou de la surface de l'eau. Son nid est fait de broussailles et toujours placé sur les plus grands arbres dans les forêts écartées. La couleur de son plumage est un mélange de rouge, de noir et d'un brun-grisâtre. La peau nue de ses jambes est jaune et couverte de petites écailles. Le mâle est un peu plus petit que la femelle; son plumage est aussi plus claire et entremêlé de taches blanches.

Fig. 3. Le Jean-le-Blanc.

(*Falco gallicus.*)

Cet oiseau a deux pieds de longueur et 5 pieds d'envergure. Sa tête, le dessus de son cou, son dos et ses ailes sont d'un brun-cendre; la gorge, la poitrine et le ventre sont blancs variés de taches d'un brun-roux. Il est surtout très-commun en France, et se nourrit de plusieurs petits animaux, tels que de rats, de souris, de hamsters etc.; au besoin il se contente aussi de grenouilles.

Fig. 4. Le Balbuzard.

(*Falco haliaeetos.*)

Le *Balbuzard* est très-nuisible aux eaux poissonneuses, parceque sa nourriture consiste principalement en poissons; comme il a la vue extrêmement perçante, il les apperçoit d'une très-grande hauteur et fond sur eux avec rapidité. Il a 2 pieds 5 pouces de longueur, et 6 pieds 6 pouces d'envergure. Son cou et son ventre sont de couleur blanche à taches rouges et brunes; ses ailes sont d'un noir brunâtre et bordées en blanc; ses jambes sont jaunes et le dessus de la tête est blanc et jaunâtre. Cet oiseau est assés commun en Allemagne et repandu en général par toute l'Europe; il se trouve aussi dans plusieurs parties de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.

Fig. 5. Le petit aigle d'Amérique.

(*Falco aquilinus.*)

Cet bel oiseau a une longueur de 2 pieds et se trouve surtout à Cayenne en Amérique. Son plumage est de couleur d'azur foncé et très-brillant; ses pieds sont jaunes et le bec est bleuâtre avec un cercle d'un jaune foncé autour des yeux. Sa gorge et les côtés de sa tête sont décorés de petites plumes de couleur de pourpre.

Fig. 6. La Buse.

(*Falco buteo.*)

Cet oiseau de proie est généralement connu en Allemagne, et se trouve aussi dans d'autres pays de l'Europe et dans l'Amérique septentrionale. Il a 2 pieds 3 pouces de longueur et 5 pieds d'envergure. Son plumage est mêlé de couleur de rouille et d'un brun-grisâtre; les plumes des ailes sont d'un brun-noir; il est cependant sujet à varier et on en trouve à peine deux bien semblables et dont les couleurs ne soient mélangées différemment. Son nid est construit de petites branches et placé sur les pins les plus élevés; il pond 2 ou 3 oeufs blanchâtres. Sa nourriture principale consiste en plusieurs petits animaux à mammelles, mais à leur défaut il ne dédaigne pas non plus les lézards, les grenouilles, les crapauds, les serpens d'eau et quelques autres amphibies.

WIENER-STADTBIBLIOTHEK